



ミラクルアミン

粉状・500g入

4.0
(N)

16.0
(P)

2.0
(Mg)

0.7
(Mn)

0.5
(B)

0.13
(Fe)

イチゴ

花芽の充実



含硫アミノ酸とリン酸16%との特殊効果

カキ

着色向上



ミカン

着色向上



キュウリ

着果対策



アスパラガス

貯蔵根の糖度対策



リンゴ

着色向上・省力化



ナス

着果向上



ピーマン

着果肥大向上



トマト

着色向上



マメ類

着莢対策



使用方法 (10a)

葉面散布

1,000倍液 (7~10日毎)
量は農薬散布量に準ずる

灌水施用

1回目: 300g~500g
以後: 7~10日毎100g~300g
果菜類、果樹類共に同量

ミラクルアミンの使い方

◎葉面散布 1,000倍 7～10日毎

*農薬混用可（銅剤、アルカリ製剤は不可）

*散布量は農薬使用量と同等

◎チューブ灌水施用 1回目 300g～500g/10a 2回目以降 100g～300g/10a 7～10日毎

*肥料混用可

対象農作物	肥効事例	使用法・時期
イチゴ	①花芽（育苗時） ②花芽（定植後）	定植30日前より5～7日毎に葉面散布4～5回 定植7日後より5～7日毎に葉面散布
ピーマン類・キュウリ トマト類・ナス	着花果向上 収量向上 耐病性向上	7～10日毎に葉面散布
スイカ・メロン		交配予定 7～10日前より 葉面散布1～2回
オクラ		草丈50～60cmより（幼生時使用不可） 7～10日毎葉面散布
豆類		開花始めより7～10日毎に葉面散布 小豆・大豆類1～2回、莢豆類7～10日毎
果菜 ミカン リンゴ 柿・ブドウ	着色向上	脱緑期～着色初期より（収穫30日位前） 灌水1回又は葉面散布1～2回 灌水＋葉面散布は更に効果的
果菜 トマト類 カラーピーマン類	特に低温による着色遅延 に効果大	灌水施用 7～10日毎又は 葉面散布 7～10日毎
根菜 ショウガ・イモ類	養分転流向上 収量向上 品質向上	養分蓄積開始期より、葉面散布 5～6回
アスパラガス		平均気温15℃前後を下回り始めたら、灌水では3回 葉面散布では3～5回
水稻		出穂35日前から出穂期まで 葉面散布1～2回
キュウリ・ナス ピーマン類・イチゴ etc	発根・活着向上 肥大向上 徒長防止 草勢強化	灌水施用 7～10日毎

使用上のご注意

- ◎カルシウムを含有する肥料及び農薬とは混用しない事
- ◎草勢不良時・N欠乏生育時には、葉面散布では使用しない事
- ◎希釈液はその日の内に使い切る事
- ◎葉面散布後2～3日間、主成分のアミノ酸特有の臭いが発生する事が有ります。作物の生育には問題がありませんが臭気が不都合な時は、灌水でご使用下さい。
- ◎ミラクルアミンを容器に入れ、水を徐々に加えながら泡立て器で攪拌して下さい。

取扱

発売元

株式会社 **ジャット** <http://www.jaht.co.jp>

本社：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-2-4

TEL 06-6121-4300 FAX 06-6121-4302

北海道（札幌） 東北（仙台）

関東（さいたま） 大阪（大阪）

九州（久留米） 南九州（宮崎）